



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ



Vue aérienne © Jean-Pierre Fournier



Département
de la Marne

Région
Champagne-Ardenne

Réserve Naturelle Régionale des Paquis à Larzicourt

FICHE D'IDENTITÉ

STATUT :
Réserve Naturelle Régionale

MILIEUX :
Etangs, roselière, marais, prairie

SURFACE : 8,3 ha

PROPRIÉTAIRE(S) : LPO France

GESTIONNAIRE(S) :
LPO Champagne-Ardenne

COMMUNE(S) : Larzicourt

DATE DE CRÉATION : 1996

PARTENAIRE(S) : Agence de l'Eau
Seine-Normandie, Conseil Régional

ACCÈS AU PUBLIC : Accès libre

CONTACT :
LPO Champagne-Ardenne
aymeric.mionnet@lpo.fr

LES MILIEUX NATURELS

Malgré sa petite taille, le site de Larzicourt n'en est pas moins très diversifié. La prairie qui borde le site devient progressivement de plus en plus humide puis se transforme en marais ou saulaie marécageuse pour finir en plan d'eau.

LES ESPÈCES

De nombreuses espèces patrimoniales typiques de Champagne-Humide peuvent être observées sur le site : Triton crêté pour les amphibiens, Cuivré des marais, Azuré du trèfle pour les papillons, Germandrée des marais, Pâturin des marais, Potamot capillaire et Ophioglosse vulgaire pour la flore. Le peuplement odonatologique est remarquable avec 36 espèces dont les rares Leucorrhine à large queue et à gros thorax. Ceci s'explique par l'absence de poissons dans le plan d'eau, particularité qui favorise le développement des plantes et des invertébrés aquatiques. Les oiseaux ne sont pas en reste car malgré la taille modeste du plan d'eau, celui-ci accueille entre autres le Grèbe castagneux, le Canard chipeau et le Fuligule milouin en période de nidification. Les migrateurs et les hivernants sont plus rares excepté au printemps ; quelques dizaines de sarcelles d'hiver et bécassines des marais fréquentent alors la prairie inondée par la remontée de la nappe aquifère.



Leucorrhine à large queue © Daniel Lafon

LA GESTION

Une gestion différenciée a été mise en place sur les espaces ouverts du site. La prairie bénéficie d'une fauche tardive pour récolter le foin par un éleveur local alors que la prairie plus humide est broyée tardivement en début d'automne. Cette gestion permet au site d'intégrer l'économie locale et de limiter la colonisation par les saules.

